

レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。

**2024年9月（第6版）
*2017年6月（第5版）

承認番号 16300BZZ00847A01

機械器具72 視力補正用レンズ
高度管理医療機器 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ 32803000

メニコンソフトS (ソフトコンタクトレンズ)

【警告】

- コンタクトレンズ（以下、レンズ）の装用により、角膜潰瘍、角膜炎（感染性角膜炎を含む）、角膜浸潤、角膜びらん等の角膜上皮障害、角膜浮腫、結膜炎（巨大乳頭結膜炎を含む）、虹彩炎、角膜血管新生等が発症する可能性及び角膜内皮細胞の減少を早める可能性があります。
レンズの装用による眼障害の中には、治療せずに放置すると失明につながるものがあります。
- 上記の眼障害を起こさないようにするためにも、レンズを使用する際は次のことを守ってください。
 - 装用時間を正しく守ること
レンズの装用時間には個人差があります。眼科医から指示された装用時間を守ってください。
 - 取扱い方法を守り正しく使用すること
レンズやケア用品の取扱い方法を誤ると眼障害につながります。レンズやケア用品（特にレンズケース）は清潔に保ち、正しい取扱い方法で使用してください。
 - 定期検査を受けること
自覚症状がなく調子よく装用していても眼やレンズにキズがついたり、眼障害が進行していることがあります。異常がなくても眼科医に指示された定期検査を必ず受けてください。
 - 異常を感じたら直ちに眼科を受診すること
レンズ装用前に眼ヤニや充血がないか、またレンズ装用後も異物感等がないか確認し、異常を感じたら眼科を受診してください。
 - 破損等の不具合があるレンズは絶対に使用しないこと
装用前に、レンズに破損等の不具合がないか必ず確認してください。装用中にレンズの破損等による自覚症状が発生し、自覚症状が改善しない場合は眼科を受診してください。

【禁忌・禁止】

- *1. 適用対象(患者): 次の人は使用しないこと
- 前眼部の急性及び亜急性炎症
 - 眼感染症
 - ぶどう膜炎
 - 角膜知覚低下
 - レンズ装用に問題となる程度のドライアイ及び涙器疾患
 - 眼瞼異常
 - レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患
 - 常時、乾燥した生活環境にいる人
 - 粉塵、薬品等が眼に入りやすい生活環境にいる人
 - 眼科医の指示に従うことができない人
 - レンズを適切に使用できない人
 - 定期検査を受けられない人
 - レンズ装用に必要な衛生管理を行えない人

*2. 使用方法

- 自分のレンズを他人に渡したり他のレンズを使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. レンズの組成

- (1) ソフトコンタクトレンズ分類：グループII
- (2) 構成モノマー：N,N-ジメチルアクリラミド、N-ビニルピロリドン、メチルメタクリレート、アルキルメタクリレート系化合物、エチレングリコールジメタクリレート
- (3) 含水率：72%
- (4) 酸素透過係数： $34 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$
ISO18369-4に準拠
- (5) 着色剤：フタロシアニン系着色剤

*2. 保存液

保存液の主成分：塩化ナトリウム

3. 原理

コンタクトレンズに付加された頂点屈折力により視力を補正する。

【使用目的又は効果】

近視、遠視、無水晶体眼の視力補正、乱視矯正、終日装用

【使用方法等】

終日装用、煮沸消毒可、化学消毒可

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. レンズ着脱

- (1) レンズ取扱いの注意事項
 - 爪を短く切り、丸くなめらかにしてください。
 - レンズを取扱う前に必ず手を洗浄してください。
 - レンズを着脱するときは、爪を立てたり、指先が直接眼にふれないようにしてください。
- (2) レンズの取り出し方
 - レンズをキズつけないように、爪を立てず指の腹でそっとレンズケースから取り出します。
 - 装用前にレンズの左右、裏表を確認してください。
- (3) レンズのつけ方
 - **1) 利き手の人さし指の先にレンズをのせます。
 - **2) 鏡を見ながら利き手の中指で下まぶたを引き下げ、もう一方の手の人さし指で上まぶたをあげます。
 - 3) レンズをゆっくりと眼に近づけ、黒眼の上にそとのせます。
 - 4) レンズを黒眼にのせたら、眼をあけていた指をゆっくり離し、まばたきをゆっくりしてください。
 - 5) 左右の見え方で、入れ違いがないかを確認してください。
- (4) レンズのはずし方
 - いつも同じ眼からレンズをはずすようにします。
 - 中指で下まぶたを引きさげます。
 - そのままの状態で親指と人さし指でレンズの下方をつまんではずします。

2. 装用スケジュール

- (1) このレンズは終日装用レンズです。レンズは起きている間に装用し、寝る前にははずしてください。
- (2) レンズの装用に慣れるまでのスケジュールは個人差があります。必ず眼科医の指示に従って、あなたにもっとも合ったスケジュールで慣らしてください。

[スケジュール例]

装用日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目以降
装用時間	8時間	10時間	12時間	14時間	16時間	終日装用

(3) 装用を中断した場合

- ・1ヶ月未満の場合は、中断する前と同じ装用時間で装用を開始します。
- ・1ヶ月以上中断した場合は、眼科を受診してから装用を開始してください。

**3.レンズケア

ソフトコンタクトレンズは装用後の洗浄と消毒が不可欠です。消毒には、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤（過酸化水素製剤等又はマルチパーパスソリューション（MPS））を用いてください。注意事項として、以下のことを守ってください。

- (1) ケア用品の使用に際しては、使用するケア用品の使用説明書や表示事項をよく読み、以下のことを守ってください。
 - ・レンズを取扱う前に必ず手を洗浄してください。
 - ・消毒前に、レンズ両面を十分にこすり洗いすることをおすすめします。
 - ・レンズ装用前にすぎをすることをおすすめします。
 - ・マルチパーパスソリューション（MPS）は、開封後1ヶ月を目安に使用してください。
 - ・使用後の消毒液は、再利用しないでください。
 - ・消毒液は他の容器に入れ替えないでください。
- (2) レンズの汚れやすさには個人差があります。眼科医の指導に従いタンパク除去を行ってください。

**4.レンズケースの管理方法

- ・レンズケースは定期的に新しいものと交換してください。
- ・使用後のレンズケースは中の消毒液を捨て、よく洗った後、自然乾燥させてください。

5.定期検査

レンズ装用開始日から1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、以降3ヶ月毎に、又は眼科医の指示に従って必ず定期検査を受けてください。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- *(1) レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。添付文書はホームページ内でもご覧になります。www.menicon.co.jp
- *(2) アレルギー疾患を有する場合は、有害事象が発生する危険性が高まりますので眼科医に相談してください。

2.不具合・有害事象

以下の不具合や有害事象が発生する可能性があります。

- *(1) 不具合
 - レンズ：欠け、破れ、キズ、変形、変色、異物付着
保存液及び容器：液漏れ、液の変色・変質、破損、汚れ
- *(2) 有害事象
 - 角膜潰瘍、角膜膿瘍、角膜穿孔、角膜漫潤、角膜びらん、角膜炎、角膜上皮ステイニング等の角膜上皮障害、角膜浮腫、角膜血管新生、結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、麦粒腫、マイボーム腺炎、霰粒腫、眼瞼下垂、調節性眼精疲労、ドライアイ、角膜内皮細胞の減少

*<装用時の症状と対処方法>

- ・眼の調子や体調が悪い場合は、無理に使用しないでください。
- ・レンズの使用中、次のような症状が発生した場合は対処方法をお試しください。症状が続く場合には速やかに眼科を受診してください。

症 状	対処方法
異物感、痛み、かゆみ、くもり、眼ヤニが多く出る、充血	<ul style="list-style-type: none">・レンズを確認し、キズや破損がある場合は、新しいレンズに交換する。・汚れがある場合は、レンズのこすり洗い、すぎを行う。・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
視力不安定、見えにくい、眼の疲れ	<ul style="list-style-type: none">・レンズの左右、裏表を確認し、レンズを正しく入れ直す。・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
乾燥感	<ul style="list-style-type: none">・数回まばたきをして涙を多く出す。・ソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼する。

3.高齢者への適用

高齢者で、自身でのレンズのつけはずしやレンズケア等ができる場合、家族の方等で補助してください。

4.妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 薬剤の服用や点眼が必要な方、妊娠、出産された方は、レンズの装用に影響を及ぼすことがありますので、眼科医に相談してください。
- (2) 小児にレンズを使用させる場合は、保護者の方等による指導監督のもとに使用してください。

5.その他の注意

- (1) レンズ紛失時及び装用中止時の対応として、予備レンズ或いは眼鏡を携帯してください。
- (2) 化粧はレンズをつけてから、化粧落としはレンズをはずしてから行ってください。
- (3) レンズを取扱うときは、化粧品等がレンズにつかないようにしてください。
- (4) 装用中に使用する目薬は、防腐剤を含まないソフトコンタクトレンズ用の人工涙液をおすすめします。それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
- (5) 水泳の際はレンズをはずしてください。
- (6) 海外渡航をされる場合には予備レンズや眼鏡を持参してください。長期間の渡航の場合には現地の医療機関を受診してください。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法：直射日光及び凍結を避け、室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- *(1) 消毒の方法：化学消毒、煮沸消毒
- *(2) レンズケア：「<使用方法等に関連する使用上の注意> 3.レンズケア」の項を参照してください。
- (3) 使用期限：定期検査時等に継続して使用可能かを眼科医に相談してください。

【包装】

1枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
株式会社メニコン
メニコンお客様センター 0120-103109
受付時間/ 9:00~18:00
(日・祝日除く)



RDSPI003-240522TOR
000000YUK00